

Inbrija[®]
(levodopa inhalation powder)
42 mg capsules

CONSEJOS ÚTILES

Consejos para empezar

¡Le damos la bienvenida a INBRIJA® (levodopa inhalation powder)!

El uso de INBRIJA puede requerir algo de práctica al principio, por lo que le proporcionamos los siguientes consejos útiles para que su experiencia sea lo más fluida posible.

- **Póngase de pie o siéntese erguido** y mire hacia delante mientras inhala. **Mantenga el inhalador nivelado** mientras esté usando INBRIJA.
- **Inhale lenta y suavemente, lo suficiente como para oír o sentir que la cápsula está girando (esto significa que está recibiendo el medicamento).** Retenga la respiración durante unos segundos. Recuerde que no es necesario inhalar con fuerza.
- **Puede inhalar más de una vez** por cápsula si es más fácil para usted.
 - Algunas personas han descubierto que **hacer inhalaciones más cortas** las primeras veces que usan el inhalador **puede ayudar a reducir la tos**
- **Es frecuente toser** al inhalar, pero intente no hacerlo. **Si expulsa el medicamento al toser, reducirá la cantidad que recibe** en el cuerpo.
 - Algunas personas han descubierto que **sorber líquidos antes o después** de inhalar el medicamento ayuda con la tos
 - Mientras inhala, si siente que podría toser:
 - Retenga la respiración durante unos segundos
 - Espere hasta que la sensación desaparezca
 - Sorba un poco de líquido
 - Vuelva a inhalar con la misma cápsula
 - Para algunas personas, la tos puede parecerse a la sensación de ahogo
 - Y recuerde, si tose, es algo esperable. Basta con que vuelva a inhalar con la misma cápsula
- **Para limpiar el inhalador**, use un hisopo de algodón nuevo y seco para quitar el polvo de los orificios de ambos lados de la boquilla con un movimiento circular. (Consulte el Paso 14 en las Instrucciones de uso).
 - También puede usar un pañuelo descartable seco para limpiar el exterior de la boquilla
 - **No limpie ninguna otra parte** del inhalador. **No enjuague la boquilla ni moje el inhalador**

Consulte el folleto informativo para el paciente y las instrucciones de uso entrando en www.INBRIJAlabelEspanol.com.

Si tiene alguna pregunta sobre INBRIJA o desea hablar con un educador del personal de enfermería para obtener más consejos de uso, póngase en contacto con nosotros directamente o visite nuestro [sitio web](http://www.INBRIJA.com/consejos-utiles).

Llamada gratuita: 1-888-887-3447

de 8 AM a 8 PM, hora del este, de lunes a viernes
[INBRIJA.com/consejos-utiles](http://www.INBRIJA.com/consejos-utiles)



INBRIJA es un medicamento con receta que se utiliza para los episodios OFF en adultos con Parkinson tratados con medicamentos habituales de carbidopa/levodopa.

Información importante de seguridad

No use INBRIJA si toma o ha tomado un inhibidor no selectivo de la monoaminooxidasa como phenelzine o tranylcypromine durante las últimas 2 semanas.

Antes de usar INBRIJA, informe a su proveedor de atención médica sobre los trastornos médicos que pudiera tener entre ellos:

- asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o cualquier enfermedad pulmonar crónica
- somnolencia durante el día, trastornos del sueño, somnolencia/aletargamiento repentinos, o uso de medicamentos que incrementan la somnolencia, incluso antidepresivos o antipsicóticos
- mareos, náuseas, sudoración o desmayos al ponerse de pie
- movimientos anormales (discinesia)
- problemas de salud mental, tales como alucinaciones o sicosis

- impulsos incontrolables, tales como participar en juegos de azar, deseos sexuales, o comer o comprar compulsivamente
- glaucoma
- embarazo o planes de embarazarse. Se desconoce si INBRIJA pudiera afectar al feto.
- amamantar o planes de amamantar. La levodopa puede pasar a la leche materna y se desconoce si pudiera afectar al bebé.

Informe a su proveedor de atención médica si toma:

- inhibidores de MAO-B
- antagonistas de la dopamina (D2) (incluidos phenothiazines, butyrophenones, risperidone, metoclopramide)
- isoniazid
- sales de hierro o multivitaminas que contengan sales de hierro

Consulte la Información importante de seguridad adicional en la contratapa.

Inbrija®
(levodopa inhalation powder)
42 mg capsules

Información importante de seguridad adicional

No maneje, opere maquinaria o realice otras actividades hasta que conozca la manera en la que INBRIJA le afecta. Pudiera presentarse somnolencia y quedarse dormido(a) repentinamente hasta un año después de haber iniciado el tratamiento.

Informe a su proveedor de atención médica si presenta los siguientes efectos secundarios:

- **quedarse dormido(a) durante actividades cotidianas normales** con o sin señales previas. Si llegara a sentir aletargamiento, no maneje o realice actividades en las que necesite estar alerta. Las posibilidades de quedarse dormido(a) durante actividades cotidianas normales aumentan si toma medicamentos que provoquen somnolencia.
- **hiperpirexia y confusión por suspensión del medicamento** (fiebre, músculos rígidos o cambios en la respiración y el ritmo cardíaco) si repentinamente suspendiera el uso de INBRIJA o de la carbidopa/levodopa, o si redujera repentinamente su dosis de carbidopa/levodopa.
- **baja presión arterial** al estar de pie (que puede estar acompañada de mareos, desmayos, náuseas y sudoración). Levántese lentamente después de haber estado sentado(a)/acostado(a).
- **alucinaciones y otras sicosis:** INBRIJA puede causar o empeorar el ver/escuchar/crear cosas que no son reales, confusión, desorientación o pensamiento desorganizado, problemas para dormir, tener muchos sueños, sospechas excesivas o sentimientos de que la gente quiere hacerle daño, comportamiento agresivo y sentimientos de agitación/inquietud.

- **impulsos incontrolables inusuales** tales como deseos de participar en juegos de azar, comer o comprar compulsivamente, y deseos sexuales se han presentado en algunas personas que utilizan medicamentos como INBRIJA.
- **movimientos corporales súbitos e incontrolados (discinesia):** INBRIJA podría causar o empeorar estos movimientos. Si esto llegara a ocurrir, podría ser necesario suspender INBRIJA o modificar el uso de otros medicamentos para el Parkinson.
- **broncoespasmo:** Las personas con asma, EPOC u otras enfermedades pulmonares podrían jadear o tener dificultades para respirar después de inhalar INBRIJA. Si esto llegara a ocurrir, suspenda la inhalación de INBRIJA y busque atención médica inmediata.
- **aumento de la presión ocular** en pacientes con glaucoma. Su proveedor de atención médica debería monitorear esto.
- **cambios en algunos resultados de laboratorio,** entre ellos los de pruebas del hígado

Los efectos secundarios más comunes de INBRIJA son tos, infección del tracto respiratorio superior, náuseas y cambios en el color de la saliva o el esputo.

No tome por vía oral más de 1 dosis (2 cápsulas) durante cualquier período OFF. No tome más de 5 dosis (10 cápsulas) en un día.

Consulte el folleto informativo para el paciente y las instrucciones de uso entrando en www.INBRIJALabelEspanol.com.