

¿Usted toma carbidopa/levodopa y nota que sus síntomas de Parkinson reaparecen?

Inbrija[®]
(levodopa inhalation powder)
42 mg capsules

Hable sin reservas: su médico puede ayudarle

Usted merece ser escuchado cuando habla de la reaparición de los síntomas



ES IMPORTANTE QUE SU MÉDICO ENTIENDA COMPLETAMENTE SUS SÍNTOMAS PARA QUE PUEDA PROPORCIONARLE LA MEJOR ATENCIÓN.

Por eso debe ser lo más sincero posible con ellos. Esta guía le ayudará a decirle a su médico cómo la reaparición de los síntomas del Parkinson impacta su vida diaria.

Indicación

INBRIJA es un medicamento recetado que se usa conforme es necesario para el tratamiento de episodios OFF en adultos con enfermedad de Parkinson que reciben tratamiento habitual con medicamentos de carbidopa/levodopa. INBRIJA no reemplaza el medicamento regular de carbidopa/levodopa.

Información de seguridad importante

No use INBRIJA si toma o ha tomado un inhibidor no selectivo de la monoaminoxidasa, como phenelzine o tranylcypromine, durante las últimas dos semanas.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el documento y en el Folleto informativo para el paciente en www.INBRIJALabel.com.

Piense en cómo sus síntomas podrían afectar a su vida diaria

1 ¿Alguna vez ha sido sorprendido por el retorno inesperado de los síntomas?

(MARQUE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN)

- Siempre Nunca
- A veces

2 ¿Cómo le hace sentir la reaparición de sus síntomas?

3 ¿Ha usted sufrido la reaparición de síntomas durante alguna de las siguientes situaciones?

(MARQUE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN)

- Mientras pasa tiempo con la familia
- Mientras está en público (por ejemplo, en un restaurante o parque)
- Mientras está en el trabajo
- En un día importante (por ejemplo, una boda o un cumpleaños)
- Mientras esté realizando actividades al aire libre

4 ¿Se ha visto usted obligado a cambiar su estilo de vida, o la manera en que hace las cosas debido a la reaparición de los síntomas?

(MARQUE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN)

- Existen muchas cosas que no puedo seguir haciendo como antes.
- Me preocupa tener que interrumpir algunas actividades en el futuro por este motivo.
- He dejado de realizar algunas cosas, pero sigo disfrutando de la mayoría de mis actividades favoritas.
- No he dejado de realizar ninguna actividad.

Información de seguridad importante (a continuación)

Antes de usar INBRIJA informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier otro trastorno médico que usted pudiera tener, entre ellos:

- Asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), o cualquier enfermedad pulmonar crónica.
- Somnolencia durante el día, trastornos del sueño, somnolencia/aletargamiento repentinos, o uso de medicamentos que incrementan la somnolencia, incluso antidepresivos o antipsicóticos.
- Mareos, náuseas, sudoración o desmayos al ponerse de pie.

- Movimientos anormales (discinesia).
- Problemas de salud mental, tales como alucinaciones o sicosis.
- Impulsos incontrolables, tales como participar en juegos de azar, deseos sexuales, o comer o comprar compulsivamente.
- Glaucoma.
- Embarazo o planes de embarazarse. Se desconoce si INBRIJA pudiera afectar al feto.
- Amamantar o planes de amamantar. Levodopa puede pasar a la leche materna y se desconoce si pudiera afectar al bebé.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el documento y en el Folleto informativo para el paciente en www.INBRIJAlabel.com.

Inbrija[®]
(levodopa inhalation powder)
42 mg capsules

Hablemos del momento en que reaparecen sus síntomas de Parkinson

Este es un ejemplo de cómo puede usar esta guía para comenzar a hablar con su médico sobre la reaparición de los síntomas.

“Me gustaría hablar de cómo la reaparición de los síntomas me ha afectado. _____
(SU RESPUESTA A LA PREGUNTA 1)

la reaparición inesperada de los síntomas me toma por sorpresa, y eso me hace sentir _____.
(SU RESPUESTA A LA PREGUNTA 2)

Estos síntomas incluso han reaparecido durante eventos en mi vida como _____.
(SU RESPUESTA A LA PREGUNTA 3)

Por ello, _____. Me gustaría poder volver a participar en
(SU RESPUESTA A LA PREGUNTA 4)

estos eventos. Me gustaría hablar sobre cómo podemos lograrlo”.



**Consulte con su médico para saber si
INBRIJA puede ser adecuado para usted.**

“

INBRIJA me ha permitido ser capaz de salir y realizar todas las cosas que realmente quiero hacer, pese a tener Parkinson.

—Jimmy, paciente que usa INBRIJA en la realidad, y participante del ensayo clínico— ”

Es importante asegurarse de que su médico entienda cómo la reaparición de los síntomas afecta su vida diaria. Asegúrese de llevar esta guía con usted durante su próxima consulta.

Información de seguridad importante (a continuación)

Informe a su proveedor de atención médica si usted toma:

- Inhibidores de MAO-B
- Antagonistas de la dopamina (D2) (incluso phenothiazines, butyrophenones, risperidone, metoclopramide)
- Isoniazid
- Sales de hierro o multivitaminas que contengan sales de hierro

Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el documento y en el Folleto informativo para el paciente en www.INBRIJAlabel.com.

Inbrija®
(levodopa inhalation powder)
42 mg capsules

Información de seguridad importante (a continuación)

NO maneje, opere maquinaria o realice otras actividades hasta que conozca la manera en la que INBRIJA le afecta. Podría presentarse somnolencia y quedarse dormido(a) repentinamente hasta un año después de haber iniciado el tratamiento.

Informe a su proveedor de atención médica si tuviera cualquiera de los siguientes efectos secundarios:

- **Quedarse dormido(a) durante actividades cotidianas normales** con o sin señales previas. Si llegara a sentir aletargamiento no maneje o realice actividades en las que necesite estar alerta. Las posibilidades de quedarse dormido durante actividades cotidianas normales aumentan si toma un medicamento que provoque somnolencia.
- **Hiperpirexia y confusión por suspensión del medicamento** (fiebre, músculos rígidos o cambios en la respiración y el ritmo cardíaco), si repentinamente suspendiera el uso de INBRIJA o de la carbidopa/levodopa, o si redujera repentinamente su dosis de carbidopa/levodopa.
- **Baja presión arterial** al estar de pie (que puede estar acompañada de mareos, desmayos, náuseas, o sudoración). Levántese lentamente después de haber estado sentado(a)/acostado(a).
- **A alucinaciones y otras sicosis** – INBRIJA puede causar o empeorar el ver/escuchar/creer cosas que no son reales; confusión, desorientación o pensamientos desordenados; problemas para dormir; tener muchos sueños; sospechas excesivas o sentimientos de que la gente quiere hacerle daño; comportamiento agresivo; y sentimientos de agitación/inquietud.
- **Impulsos incontrolables inusuales**, tales como deseos de participar en juegos de azar, comer o comprar compulsivamente, y deseos sexuales se han presentado en algunas personas que utilizan medicamentos como INBRIJA.
- **Movimientos corporales súbitos e incontrolados (discinesia)** – INBRIJA podría causar o empeorar estos movimientos. Si esto llegara a ocurrir, podría ser necesario suspender INBRIJA o modificar el uso de otros medicamentos para el Parkinson.
- **Broncoespasmo** – Las personas con asma, EPOC u otras enfermedades pulmonares podrían jadear o tener dificultades para respirar después de inhalar INBRIJA. Si esto llegara a ocurrir, suspenda la inhalación de INBRIJA y busque atención médica de inmediato.
- **Aumento de la presión intraocular** en pacientes con glaucoma. Su proveedor de atención médica debería monitorear esto.
- **Cambios en algunos resultados de laboratorio**, entre ellos los de pruebas del hígado.

Los efectos secundarios más comunes de INBRIJA son tos, infección del tracto respiratorio superior, náuseas y cambio en el color de la saliva o el esputo.

No inhale por vía oral más de una dosis (2 cápsulas) para cualquier periodo OFF. No tome más de 5 dosis (10 cápsulas) en un día.

Consulte el Folleto informativo para el paciente en www.INBRIJLabel.com.



ACORDA THERAPEUTICS, el logotipo estilizado de ACORDA THERAPEUTICS, INBRIJA y el logotipo de INBRIJA son marcas comerciales registradas de Acorda Therapeutics, Inc.
© 2023 Acorda Therapeutics, Inc. Todos los derechos reservados. 02/23 INB13206